ECOUVILLONNAGE OROPHARYNGE PUIS NASOPHARYNGE AVEC LE MEME ECOUVILLON

Le respect des recommandations de prélèvement est essentiel au recueil correct du virus.

PREPARATION

- Equipement de protection selon les recommandations en vigueur (masque FFP2, lunettes de protection, sur blouse UU*, charlotte UU*, gants UU*). *UU usage unique
- Ecouvillon fin
- Tube de transport, E-swab bouchon orange, Milieu liquide Amies 3 ml

REALISATION

- Prélever **en grattant bien** (les virus sont intracellulaires) au niveau des piliers des amygdales et du voile du palais puis retirer l'écouvillon.



- Insérer ensuite délicatement **le même écouvillon** le long du septum nasal juste au-dessus du plancher des fosses nasales jusqu'à rencontrer une résistance au niveau du nasopharynx.

⚠ Ne pas suivre l'arrête nasale : risque de douleur et de saignement.

- Tourner l'écouvillon délicatement contre la muqueuse du nasopharynx pendant 10 à 15 secondes puis retirer l'écouvillon.




- Décharger l'écouvillon (5 sec) dans le tube contenant le milieu de transport
- **RETIRER** l'écouvillon du tube et prendre soin de **JETER** l'écouvillon
- Refermer le tube et désinfecter l'extérieur
- Identifier le tube



- Envoyer le prélèvement au laboratoire avec une poche dédiée.
- Le prélèvement peut être conservé à 2-8°C pendant 48h.